

Antibiotika i samband med måltid

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Maria Granborn, läkemedelsenheten

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	2
2	Rekommendationer	2
2.1	Preparat som bör tas på fastande mage (1 timme före eller 2 timmar efter måltid)	2
2.2	Preparat som bör tas tillsammans med mat	2
2.3	Preparat vars absorption minskar på grund av bindning till metalljoner eller vid högt pH i magsäcken	3
2.4	Preparat som interagerar med alkohol	3

1 Inledning

Absorptionen av antibiotika kan påverkas av ett samtidigt födointag. Ofta fås en bättre/snabbare absorption när antibiotika tas på fastande mage, men för vissa antibiotika är det önskvärt att minska risken för biverkningar från mag-tarmkanalen genom att ta läkemedlet tillsammans med föda.

2 Rekommendationer

2.1 Preparat som bör tas på fastande mage (1 timme före eller 2 timmar efter måltid)

- ceftibuten (Isocef)
- ciprofloxacin (Ciproxin)
- doxycyklin (endast Oracea)
- flukloxacillin (Heracillin)
- fusidinsyra (Fucidin)
- isoniazid (Tibinide)
- norfloxacin (Norfloxacin)
- penicillin V (Kåvepenin, Avopenin, Tikacillin)
- rifampicin (Rimactan, Rifadin, samt flera kombinationspreparat)
- roxitromycin (Surlid, Roximstad)

2.2 Preparat som bör tas tillsammans med mat

- amoxicillin-klavulansyra (Betaklav, Bioclavid, Klaximol, Spektramox)
- atovakvon (Wellvone)
- cefadroxil (Cefamox)
- doxycyklin (Doxyferm, Vibranord)
- erytromycin (Abboticin Novum, Ery-Max)
- nitrofurantoin (Furadantin)
- tinidazol (Fasigyn)

2.3 Preparat vars absorption minskar på grund av bindning till metalljoner eller vid högt pH i magsäcken

Preparat	Interagerar med
Tetracykliner , t ex doxycyklin (Doxyferm, Vibranord)	antacida, kalcium, järn, zink, kinapril
Kinoloner, t ex ciprofloxacin (Ciproxin), moxifloxacin (Avelox), levofloxacin (Tavanic)	antacida, kalcium, järn, zink, sukralfat (Andapsin), lantankarbonat (Fosrenol), sevelamer (Renagel, Renvela)

Ovanstående preparat kan kombineras om intag skiljs åt i tid. Se FASS för närmare information.

Observera att även mejeriprodukter såsom mjölk, yoghurt och mineralberikade drycker kan minska absorptionen för ovannämnda tetracykliner och kinoloner.

Absorptionen av doxycyklin minskar vid samtidig behandling med läkemedel som höjer pH i magsäcken, t ex protonpumpshämmare. Se Janusmed interaktioner för närmare information.

2.4 Preparat som interagerar med alkohol

Metronidazol (Flagyl) och tinidazol (Fasigyn) kan orsaka en antabusliknande reaktion om de kombineras med alkohol. Undvik alkohol under behandlingen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.