

Neonatala transporter- akutläkemedel

Läkemedel	Adrenalin	Tribonat	NaCl eller E-konc (volym)	
Koncentration	0,1 mg/ml	0,5 mmol/ml	0,9 mg/ml	---
Spädning	Nej	Nej	Nej	Nej
Normaldos	0,1 ml/kg	2 ml/kg, ges på 5 minuter	10 ml/kg	10 ml/kg
Adminstrationssätt	i.v.	i.v.	i.v.	i.v.
Kroppsvikt				
1,0 kg	0,1 ml	2 ml	10 ml	10 ml
2,0 kg	0,2 ml	4 ml	20 ml	20 ml
3,0 kg	0,3 ml	6 ml	30 ml	30 ml
4,0 kg	0,4 ml	8 ml	40 ml	40 ml

Läkemedel	Na-bikarbonat	Naloxon	Stesolid Novum
Koncentration	50 mg/ml	0,4 mg/ml	5 mg/ml
Spädning	Nej	Nej	Nej
Normaldos	2 ml/kg ges på 5 minuter	0,25 ml/kg	0,05 ml/kg
Adminstrationssätt	i.v.	i.v./i.m.	i.v.
Kroppsvikt			
1,0 kg	2 ml	0,25 ml	0,05 ml
2,0 kg	4 ml	0,5 ml	0,1 ml
3,0 kg	6 ml	0,75 ml	0,15 ml
4,0 kg	8 ml	1,0 ml	0,2 ml



Läkemedel	Furix/Impugan	Calciumgluconat	Atropin
Koncentration	10 mg/ml	0,225 mmol/ml	0,0499 mg/ml
Spädning	Nej	Nej	Nej
Normaldos	0,1 ml/kg	1 ml/kg	0,4 ml/kg
Adminstrationssätt	i.v.	Ges iv på 10 min, cave extravasering!	i.v .
Kroppsvikt			
1,0 kg	0,1 ml	1,0 ml	0,4 ml
2,0 kg	0,2 ml	2,0 ml	0,8 ml
3,0 kg	0,3 ml	3,0 ml	1,2 ml
4,0 kg	0,4 ml	4,0 ml	1,6 ml

Läkemedel	Celocurin	Morfin	Pentotal 500 mg
Koncentration	50 mg/ml	1,0 mg/ml	500 mg/ampull
Spädning	1 ml+ 9 ml NaCl = 5 mg/ml	1 ml+9 ml 5% Glucos = 100 mikrogram/ml	Steg 1) 1 Ampull+20 ml sterilt vatten = 25 mg/ml Steg 2) 1 ml av 25mg/ml + 9 ml NaCl= 2,5 mg/ml
Normaldos	0,4 ml/kg	0,1 ml/kg/timme	<2kg: 2 mg/kg=0,08ml/kg >/= 2kg: 3mg/kg=0,12ml/kg
Adminstrationssätt	i.v.	INFUSION	i.v.
Kroppsvikt			
1,0 kg	0,4 ml	0,1 ml/h	0,8 ml
2,0 kg	0,8 ml	0,2 ml/h	2,4 ml
3,0 kg	1,2 ml	0,3 ml/h	3,6 ml
4,0 kg	1,6 ml	0,4 ml/h	4,8 ml