

Smärtbehandling i samband med sectio

Gäller för: BB-avdelning 8

Innehåll

Smärtbehandling i samband med sectio	1
1 Preoperativ vid elektiv operation.....	1
2 Postoperativ smärtbehandling.....	1
3 Vid överdosering.....	3
4 Övervakning.....	3
4.1 Övervakning vid i.v. injektion med opiater.....	3
5 Vid utebliven effekt	3

1 Preoperativ vid elektiv operation

Tre till fyra timmar innan planerad sectio gives, tablett Alvedon 665 mg 2 st.

Peroperativt, vid elektiv eller akut operation, då operationen avslutas,
Infiltration av Marcain 2,5 mg/ml 20 ml runt op-såret.

2 Postoperativ smärtbehandling

Tablett Alvedon 665 mg 2 x 3

S/Tablett Diklofenak 50mg 1x3

Tablett Targiniq 5/2.5mg 1x2

Tablett/ injektion Primperan i ordinarie doser 10 mgx3 po/iv vid behov, vid smärta p.g.a tarmparalys.

Tablett Alvedon, Tablett Diklofenak och Tablett Targiniq kan ges till patienten vid ankomst till BB i tre stycken separat uppmärkta påsar, för egen hantering under de två första dygnet efter noggrann information om hur intagen skall ske.

OBS! Ge endast ut påsar till de mammor som bedöms klara av detta själva.

Kontraindikationer

Allergi mot ingående ämnen samt för
Alvedon: Allvarlig leversjukdom

Targiniq: Allvarlig Leversjukdom eller allvarlig lungsjukdom
Diklofenak: GI-sår. Allvarlig leversjukdom, hjärtsvikt eller njursvikt. Korsallergi mot ASA. Försiktighet vid astma.

Tilläggsmedicinering vid NRS >3

- Injektionsbehandling med Morfin, 1:a-handsalternativ.
- Försiktighet vid njurinsufficiens , då kan 3:a-handsalternativ ges.
- Morfin, intravenös behandling
- Morfin, inj 10 mg/ml.

Koncentration

Blanda Morfin 10 mg/ml 1 ml med NaCl 9 mg/ml 9 ml i en 10 ml spruta. Detta ger Morfin 1 mg/ml.

Ge 1-3 mg (1-3 ml) Morfin i.v. Detta kan upprepas var 3:e minut tills NRS = 3.
Max 20 mg (20 ml) Morfin per smärttillfälle.

Oxynorm lösning/kapsel p.o., 2:a-handsalternativ – används då intravenös infart saknas.

Dosering : Oxynorm lösning 1mg/ml, 5ml p.o., alternativt Oxynorm kapsel 5mg p.o. Maximal plasmakoncentration ses 1 timme efter administration. Kan upprepas med 6 timmars intervall.

Injektionsbehandling med Ketogan, 3:a-handsalternativ

Ketogan, intravenös behandling
Ketogan Novum, inj 5 mg/ml.

Koncentration

Blanda Ketogan 5 mg/ml, 2 ml med NaCl 9 mg/ml 8 ml i en 10 ml spruta. Detta ger Ketogan 1 mg/ml. Ge 1-2 mg (1-2 ml) Ketogan i.v. Detta kan upprepas var 3:e minut tills NRS =3.

Max 20 mg (20 ml) Ketogan per smärttillfälle.

Allmänt opiater

Kontraindikationer

Vid sekretstagnation, andningsdepression, sömnmedelspåverkan, alkoholpåverkan. Om patienten genomgått sectio i spinalbedövning innehållande Fentanyl och trots det behöver extra opioid inom 6 timmar efter att bedövningen lagts skall extra övervakning ske med MEWS kontroller var 30:e minut

PM Kejsarsnitt, övervakning efter kejsarsnitt i spinal som kompletterats med Fentanyl.

Till patienter som ordinerats epidural opioid får inte ges tilläggsmedicinering med opioider eller sederande läkemedel, oavsett distributionssätt, utan föregående

kontakt med anestesilog, enligt anestesiklinikens PM Epidural-analgesi för postoperativ smärtlindring på vårdavdelning.

3 Vid överdosering

Det finns risk för andningsdepression. Regelbunden kontroll andningsfrekvens och sedering enl MEWS. **Vid påtaglig slöhet och och sedering andningsfrekvens mindre än 8/minut, lämna inte patienten ensam, sätt syrgas 4 liter via näskateter och kontakta läkare/ vid behov narkosläkare. Följ läkarordination: Vid behov ges Naloxonhydroklorid 0,4 mg/ml. Ge 0,25 ml = 0,1 mg i.v. Kan upprepas. Övervaka därefter patienten.**

4 Övervakning

4.1 Övervakning vid i.v. injektion med opiater

Kontrollera patientens andningsfrekvens och sederingsgrad kontinuerligt under 30 minuter efter sista i.v. injektionen. Kontakt tas med läkare om behandlingen inte gett önskad effekt.

5 Vid utebliven effekt

Om den önskade effekten uteblir kan det bero på komplikationer till operationen. Kontakt tas med läkare.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.