

Förgiftning Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Försiktighet

Specifik behandling

- Vid helt vaken patient som intagit giftigt ämne eller överdos som inte är ett frätande ämne eller petroleumprodukt, ge **Kolsuspension (150mg/ml)** 150ml per os.
- Vid helt vaken patient som intagit frätande ämnen eller petroleumprodukter, ge snarast gärna fetthaltig dryck (mjölk/grädde). Framkalla inte kräkning!
- Vid ventilationskrävande dos av opioider, ge inj. **Naloxonhydroklorid**. Dosen kan upprepas vid behov, beakta halveringstiden. Sträva efter spontanandning (AF >8/min) och normal saturation.
- Vid ventilationskrävande dos av bensodiazepiner känd eller misstänkt, inj. **Flumazenil (0,1 mg/ml)** 3 ml iv. Om tillräcklig vakenhet och andningsfunktion inte uppnås inom 60 sek. kan upprepade doser om 1-2 ml ges.

Speciellt att tänka på

- Medicinskt kol ska inte ges om aspirationsrisk föreligger.
- För stöd och råd angående substansens verkan kontakta giftinformationen telefon: 08-331231, alternativt SOS-alarm.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare