

Hypoglykemi Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Orsak

Oftast lågt intag av föda i förhållande till insulinom(ovanligt)
insulindos.

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S Blek hud. Kallsvettig. Hungerkänslor. Förvirring. Oro. Aggressivitet. Medvetandesänkning. Kramper.

O Plötslig insjuknande.

P

Q

R

S

T

A

M Insulin, -dos. Perorala antidiabetika.

P Diabetes. Alkohol. Tidigare hypoglykemi.

L Födointag.

E Vad föregick insjuknandet. Fysisk ansträngning.

Riktad undersökning

P-glukos (i regel <3 mmol/l). Insulinpump.

Behandling

Vaken patient

Peroral kolhydrattillförsel(dextrosol och dylikt)

Medvetslös/ej samarbetsvillig patient

- Inj. glukos 300 mg/ml, 10 ml iv. Kan upprepas tills patienten vaknar. Max 100 ml.

alternativt om patienten ej gör motstånd

- Inf. glukos 100mg/ml iv/io. Ges tills patienten vaknar. Riktvärde: 3 ml/kg.

Om venväg ej kunnat etableras

- Inj. glukagon 1 mg/ml, 1 ml im eller sc.

Patient som vaknat efter behandling men ej vill/kan ta något per os

- Inf. glukos 100 mg/ml, iv/io.

Infusionstakten regleras efter medvetandegrad och/eller P-glukosvärde.

Specifik övervakning

Rytmövervakning

Upprepa P-glukosmätning

Fortsatt handläggning

Insulinbehandling, diabetiker (typ 1)

- Vaken, klar patient kan få kvarstanna i hemmet när det är lämpligt, om patienten så vill, har adekvat tillsyn och kunnat äta. (gäller ej gravida, förutom efter läkarkontakt).
- Om patienten lämnas kvar i hemmet skall detta dokumenteras i Cambio Cosmic. Anteckningen läggs för vidimering av patientens diabetessköterska eller läkare.

Tablett- samt kombinationsbehandling (tablett och insulin), diabetiker (typ 2)

- Skall transporteras av ambulans till vårdinrättning.

Tänk på

- Mål för behandling är ett P-glukos > 5 mmol/l samt att patient bör kunna äta och dricka.
- Om patienten ej vaknar som förväntat överväg annan orsak till medvetandesänkningen (Tänk MIDAS).
- Om det finns skäl att anta att patienten har körkort ska vi alltid underrätta vår medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) om vår behandling i de fall vi lämnar patienten på plats.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare