

Brännskada/Frätskada Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Försiktighet

- Tänk på din egen säkerhet!
- Använd kemdräkt vid behov.
- Utvärdera tidigt eventuellt hot för luftvägen.
- Tetracain är kontraindicerat vid pepparspray.

Specifik behandling

Avbryt omedelbart fortsatt exponering.

- Ge alltid högsta dos oxygen > 10 l/min med tanke på rökexponering.
- Kyl skadat område med rumstempererad **Ringeracetat**. Vid frätskador kyl endast med vatten. Dock max 10 % av hela hudkostymen och maxtid 15 minuter åt gången.
- Håll patienten varm, förhindra hypotermi, varm sjukhytt.
- Djup brännskada skyddas med torra rena dukar.
- Påbörja vätskebehandling med varm **inf. Ringeracetat iv.**
- Smärtlindra vid behov enligt riktlinjer för smärta.

Vid hosta, luftvägssymtom

- Ge **inh. Salbutamol (2mg/ml) 5ml**, kan upprepas.

Speciellt att tänka på

- Om ögonen är drabbade av kemikalier eller annat toxiskt ämne, skölj med ögondusch helst hela resan.
- Vid utbredda skador på huden förlorar patienten mycket vätska, var generös med varm inf. Ringeracetat iv.
- Vid elektriska brännskador koppla upp patienten på minst 3-avl EKG.
- Antidoter finns i container ”stor skadeplats”.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare