

Graviditetskomplikationer Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Försiktighet

- Blödningar under graviditet ska inte anses som normalt. Dessa patienter ska till gyn för undersökning.
- Perifer venkateter ska alltid säkerställas vid gynekologiska blödningar, minst 18G (grön).

Specifik behandling

- Vid hypotension lägg patienten i vänster sidoläge (pga vena cava).
- Vid stor blödning eller hypotension och påverkad patient behandla enligt riktlinje chock. Förvarna och snabb transport in till förlossningen.
- Vid navelsträngsframfall lägg patienten i Trendelenburgs läge.
- Om patienten har värkar innan beräknad datum för nedkomst kontakta förlossningsläkare och ge efter ordination **inj. Terbutalin (0,5 mg/ml) 0,5 ml sc.**
- Smärtlindring efter läkarkontakt.
- Kvinnor med preeklampsi är väldigt känsliga för yttre stimuli. Se till att skapa lugn och ro, släck belysning och kontrollera blodtrycket kontinuerligt. Vid kramper behandla med **inj. Midzolam (5mg/ml) 0,5-2ml iv.**

Speciellt att tänka på

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare