

Brännskada/Frätskada, barn Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Försiktighet

- Tänk på din egen säkerhet!
- Använd kemdräkt vid behov.
- Utvärdera tidigt eventuellt hot för luftvägen.

Specifik behandling

- Ge alltid högsta dos **Syrgas** > 10 l/min med tanke på rökexponering.
- Kyl skadat område med rumstempererad Ringer-acetat. Vid frätskador kyl endast med vatten. Dock max 10% av hela hudkostymen och maxtid 15 minuter åt gången.
- Håll patienten varm, förhindra hypotermi, varm sjukhytt.
- Djup brännskada skyddas med rena dukar.
- Påbörja vätskebehandling med varm **inf. Ringeracetat iv.**
- Smärtlindra vid behov enligt riktlinjer för smärta.

Vid hosta, luftvägssymtom

- Ge **inh. Salbutamol (2 mg/ml)**. Späd med **Natriumklorid (9 mg/ml)** till 2 ml.

Barn	Salbutamol (2 mg/ml) inhalation
Vikt	Volym (ml)
5 kg	0,4
10 kg	0,75
15 kg	1,0
20 kg	1,5
25 kg	2,0
≥30	2,5

Kan upprepas efter 15 minuter.

- Vid fortsatta besvär ge **inh. Adrenalin (1mg/ml)**. Späd med **Natriumklorid (9 mg/ml)** till 2 ml.

Barn	Adrenalin (1 mg/ml) inhalation
Vikt	Volym (ml)
5 kg	0,25
10 kg	0,5
15 kg	0,75
20 kg	1,0
25 kg	1,25
30 kg	1,5
≥40 kg	2,0

Speciellt att tänka på

- Om ögonen är drabbade av kemikalier eller annat toxiskt ämne, skölj med ögondusch helst hela resan.
- Vid utbredda skador på huden förlorar patienten mycket vätska, var generös med varm **inf. Ringeracetat iv.**
- Vid elektriska brännskador koppla EKG.
- Antidoter finns i container "stor skadeplats".
- Var frikostig med **Lidokain/ Prilokain-plåster.**

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare