

Falsk krupp, barn Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Orsak

Virus

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S Tilltagande skällande hosta. Lufthunger. Inspiratorisk stridor. Feber.

O Akut debut, ofta nattetid eller en stund efter sänggående.

P Vill sitta upprätt.

Q Stridor, lufthunger.

R Lokaliserat till halsen.

S

T

A

M Givna läkemedel.

P Tidigare kruppanfall. ÖLI. Astma. Halsont.

L Inkluderar nappflaska/amning.

E ÖLI. Halsont. Låg- till måttlig feber. Allmän sjukdomskänsla.

Riktad undersökning

Andningsbiljud. Interkostala/jugulära indragningar. Accessorisk andningsmuskulatur.

Behandling

- Låt barnet sitta upprätt. Trösta och lugna.

- **Inh. adrenalin (1 mg/ml)**

Kroppsvikt (kg)	5	10	15	20	25	30	≥40
Volym (ml)	0,25	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0
Späd med Natriumklorid (9mg/ml) till 2 ml							

Kan upprepas. Vid kraftig pulsökning/tremor, gör paus i behandlingen och ge enbart oxygen.

- **T. betametason (0,5mg)**, 8 tabl löst i vatten.

Vid allvarligt tillstånd

- **Lidokain/ Prilokain-plåster** Barn 0-2 mån: 1 st plåster. Barn >3mån: 2 st plåster.
- Venös access vb.
- Transportera sittande på bår.
- Assistera andningen vid utmattnig.

Specifik övervakning

Överväg EKG-övervakning vid transport.

Tänk på

-

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare