

Paracetamol Infusion Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Paracetamol, infusionsvätska (10 mg/ml)

Indikationer

- Smärta
- Hög feber
- När oral och rektal administrering ej är möjlig/lämplig

Försiktighet

- Högre dos än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada
- **Fråga aktivt om patienten redan tagit läkemedel som innehåller paracetamol.** Tidpunkt? Dos?
- Försiktighet vid kronisk alkoholism samt undernäring

Kontraindikationer

- Överkänslighet mot paracetamol
- Svår leversjukdom

Biverkningar

- Hypotension
- Allergiska reaktioner

Doser

- **Vuxen** (> 50 kg): **Inf Paracetamol (10 mg/ml)** 100 ml (1 g) i.v.
- **Barn** över 3 månader: **Inf Paracetamol (10 mg/ml)** 15 mg/kg, i.v. enligt tabell

Vikt	Paracetamol (10 mg/ml), i.v.
6-7 kg	9 ml
8-9 kg	12 ml
10-14 kg	15 ml
15-19 kg	22 ml
20-29 kg	30 ml
30-39 kg	45 ml
40-40 kg	60 ml
≥ 50 kg	100 ml

Speciellt att tänka på

- Paracetamol lösningen ges som intravenös infusion under 15 minuter.
- **Praktiska tips:** Ta bort överflödiga volym infusionsvätska från flaskan och ge den uträknade volymen som är kvar i flaskan. Ex: Barnet väger 45 kg. Ska ha 60 ml = 600 mg. Paracetamol (10 mg/ml) 100 ml flaska: Tag bort 40 ml med uppdragskanyl och spruta. Ge de 60 ml som är kvar i flaskan som infusion. Vid små volymer: Dra upp rätt mängd i spruta och ge infusionsvätskan som små delinjektioner i.v. under 15 minuter.
- Risk för hypotension vid snabb administrering.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare