

## Paracetamol Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Paracetamol, tablett (500 mg), suppositorier (250 mg)

### Indikationer

- Smärta
- Hög feber

### Försiktighet

- Högre dos än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada.  
**Fråga aktivt om patienten redan tagit läkemedel som innehåller paracetamol. Tidpunkt? Dos?**
- Försiktighet vid kronisk alkoholism samt undernäring

### Kontraindikationer

- Överkänslighet mot paracetamol
- Svår leversjukdom

### Biverkningar

- Allergiska reaktioner

### Doser

#### Vuxna

- **Paracetamol** 1 g po eller pr.

#### Barn

- **Paracetamol** 25 mg/kg po eller pr. enligt tabell

Vikt	<b>Paracetamol</b> , tablett po eller supp pr	<b>Paracetamol</b> supp
------	---	-------------------------

		250 mg
5-9 kg	125 mg	½ supp
10-14 kg	250 mg	1 supp
15-19 kg	375 mg	1 ½ supp
20-29 kg	500 mg	2 supp
30-39 kg	750 mg	
≥ 40 kg	1000 mg	

### Speciellt att tänka på

- Ovanstående initiala doser ges till barn inom sjukvården och avviker från doserna i FASS, de är ej avsedda för egenvård.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare