

Glyceryltrinitrat Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Glyceryltrinitrat, spray (0,4 mg/dos)

Indikationer

- Bröstsmärtor av kardiellt ursprung
- Lungödem
- Blodtryckssänkning vid vissa tillstånd (aortaaneurysm, hypertensiv kris)

Försiktighet

- Förvissa dig om att patienten inte intagit **potenspreparater** som t.ex. **Viagra®** sista dygnet
- Försiktighet om systoliska blodtrycket är mindre än 90 mm Hg

Kontraindikationer

- Akut cirkulationssvikt
- Kardiogen chock
- Hjärttamponad
- Perikardit
- Överkänslighet mot Nitroglycerin
- Samtidig behandling med Viagrapreparat

Biverkningar

- Huvudvärk, yrsel
- Hypotension, ökad hjärtfrekvens

Doser

- Ge **spray Glyceryltrinitrat (0,4 mg/dos)**, 1 dos under eller på tungan, kan upprepas vid fortsatt smärta och systoliskt Bltr ≥ 90 mmHg.

Speciellt att tänka på

- Doseringen av glycerylnitratpreparat är individuell och skall styras av det kliniska svaret.
- Glycerylnitrat är effektivt vid angina pectoris. Andra tillstånd som t.ex. esofagusspasm kan också svara på behandlingen.
- Risk för ortostatisk reaktion om patienten ställer sig upp.
- Kan orsaka kraftiga blodtrycksfall. Patienten skall ha en venös infart innan behandling med Glyceryltrinitrat.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare