

Naloxonhydroklorid Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Naloxonhydroklorid, injektionsvätska (0,4 mg/ml)

Indikationer

- Överdoserings och andningsdepression orsakad av samtliga analgetika av morfintyp (opioider)

Kontraindikationer

- Överkänslighet mot Naloxonhydroklorid

Försiktighet

- Kan hos patienter med kontinuerlig opiatbehandling/opiatberoende ge upphov till akuta abstinenssymtom. Titra försiktigt i smådoser!
- Tänk på att snabb reversering hos missbrukare kan leda till aggressivt beteende och ökad hotbild
- Kortare halveringstid för Naloxonhydroklorid än för de flesta opiater medför risk för återkommande andningsdepression. Övervaka patienten noggrant och var beredd att upprepa dosen

Biverkningar

- Illamående, kräkningar, svettningar, yrsel, huvudvärk, tremor
- Arytmi, hypotension, hypertension
- Lungödem

Dosering

Vuxen

- 1 ml Naloxonhydroklorid 0,4 mg/ml späds med 9 ml Natriumklorid 9 mg/ml till 0,04 mg/ml. Ge Naloxonhydroklorid 0,04 mg/ml 2-3 ml i.v. åt gången, upprepa tills andningsfunktionen förbättrats. Maxdos 0,4 mg, därefter läkarkontakt. Sträva efter spontanandning (AF > 8 /min).
- **Om venväg misslyckas:** Ge utspädd Naloxonhydroklorid 0,4 mg/ml 0,5-1 ml i.m., s.c. eller intranasalt.

Barn

- Intravenöst: 1 ml Naloxonhydroklorid 0,4 mg/ml spädes med 9 ml Natriumklorid 9 mg/ml till 0,04 mg/ml. Titrera angiven dos i flera "smådosor" tills andningsfunktion är förbättrad.
- Intranasalt: Lämplig volym intranasalt 0,2-0,5 ml/näsborre. Om lägre mängd spädd med Natriumklorid 9 mg/ml till minst 0,2 ml. Dra upp 0,1ml extra i sprutan för att kompensera för deadspace i MAD,.

Vikt	Kg	5	10	15	20	25	30	>40
Intravenöst (0,01mg/kg), titreras Naloxonhydroklorid utspädd till 0,04 mg/ml	Ml	1,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,5	10
Intranasalt/im/sc (0,01 mg/mg) Naloxonhydroklorid 0,4 mg/ml	Ml	0,1	0,25	0,35	0,5	0,6	0,75	1,0

Kan upprepas EN gång efter läkarkontakt

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare