

Morfin Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Morfin, injektionsvätska (10 mg/ml)

Indikationer

- Bröstmärtor av misstänkt kardiellt ursprung
- Lungödem
- Isolerade extremitetsskador/trauma
- Brännskada
- Akut buk (men med viss försiktighet)

Försiktighet

- Kan orsaka andningsdepression, hypotension och kräkning
- Används med försiktighet vid astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom och chock
- Kan maskera tecken och symptom vid ett skalltrauma. Använd med försiktighet till skullskadade patienter
- Var förberedd på att assistera andningen eller att administrera antidoten Naloxonhydroklorid
- Äldre patienter kan få sänkt medvetande redan vid låga doser

Kontraindikationer

- Känd känslighet för morfin
- Orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan

Biverkningar

- Hypotension
- Gall- och urinvägsspasm
- Illamående och kräkningar
- Sederig
- Andningsdepression

Doser

Vuxen

- Ge inj. **Morfin (1mg/ml)** 1-3 ml i.v. eller i.m. Maxdos 20ml.

Barn

- Späd inj. **Morfin (10mg/ml)** 1ml med **NaCl (9mg/ml)** 9ml till styrkan inj. **Morfin (1mg/ml)**.
Ge inj. **Morfin (1mg/ml)** i.v. enligt tabell:

Barn	Morfin (1 mg/ml) intravenöst
Vikt	Volym
20 kg	2,0 ml
30 kg	3,0 ml
40 kg	4,0 ml
50 kg	5,0 ml

Speciellt att tänka på

- Om andningsdepression uppträder ventiler patienten och ge eventuellt Naloxon (0,4 mg/ml). Under långa transporter kan upprepade doser Naloxon behövas.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare