

Glukagon Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Glucagon, endosspruta (1mg)

Indikationer

- Känd eller misstänkt hypoglykemi hos diabetiker där intravenös infart inte kan etableras

Försiktighet

-

Kontraindikationer

- Allergi eller känd känslighet för Glukagon
- Feokromocytom (binjuremargstumör)

Biverkningar

- Illamående och kräkningar
- Kan orsaka övergående ökning i blodtryck och hjärtfrekvens

Doser

Vuxen

- Ge inj. **Glucagon (1 mg/ml)** 1 ml i.m. eller s.c.

Barn

- Under 25 kg - Ge inj. **Glucagon (1 mg/ml)** 0.5 ml i.m. eller s.c.
- Över 25 kg - Ge inj. **Glucagon (1 mg/ml)** 1 ml i.m. eller s.c.

Speciellt att tänka på

- Om patienten redan har fått **Glucagon** av anhörig kan ytterligare en dos ges om patienten fortfarande är medvetslös efter 15 minuter och om inte fri venväg kan etableras.
- Om patienten är komatös p.g.a. diabetisk ketoacidosis eller hyperglykemi kommer **Glucagon** inte i någon nämnvärd omfattning förvärra situationen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare