

Furosemid Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Furosemid, injektionsvätska (10 mg/ml)

Indikationer

- Lungödem
- KOL
- Patienter som bedöms vara volymsbelastade baserat på kliniska fynd som t.ex. "rassel på lungorna", stasade halsvener och/eller ödem och deras tillstånd inte beror på en svår infektion som t.ex. pneumoni med sekret

Försiktighet

- Läkare ska kontaktas om Furosemid ska ges i.v. till en hypotensiv patient eller till patienter med allergi för sulfa-baserade läkemedel

Kontraindikationer

- Överkänslighet för Furosemid och närstående sulfonamider (t.ex. peroralt antidiabetikum)
- Hotande eller manifest leverkoma

Biverkningar

- Elektrolytstörningar

Doser

- Lungödem - Ge inj. Furosemid (10mg/ml) 4-8ml i.v.
- KOL - Ge eventuellt: inj. Furosemid (10 mg/ml) 2 ml i.v. (Bltr.≥90mmHg).

Speciellt att tänka på

- Vid interhospitala transporter bör patienten ha en KAD för övervakning av diuresen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare