

## Fentanyl Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

### Fentanyl injektionsvätska (50 µg/ml)

#### Indikationer

- Smärtlindring

#### Försiktighet

- Kan orsaka andningsdepression, hypotension och kräkning
- Används med försiktighet vid astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom och chock
- Kan maskera tecken och symtom vid ett skalltrauma. Bör undvikas till patienter med nedsatt cerebral cirkulation

#### Kontraindikationer analgesi

- Får inte ges till patienter med andningsdepression
- Får inte ges till patienter med sekretstagnation

#### Biverkningar

- Yrsel
- Bradykardi och övergående blodtrycksfall
- Andningsdepression, apné
- Illamående och kräkningar
- Muskelrigiditet (inklusive bröstkorghmuskulatur)

## Doser analgesi

### Vuxen

- Ge **Fentanyl (50µg/ml)**, 2 ml intranasalt (1 ml i vardera näsborren).

### Barn

- Ge **Fentanyl (50µg/ml)** intranasalt enl. tabell (halva volymen i vardera näsborren).

Barn	Fentanyl 50µg/ml intranasalt
Vikt	Volym
20 kg	0,6 ml
30 kg	0,9 ml
40 kg	1,2 ml
50 kg	1,5 ml

### Dos inför intubation

- Inj. Fentanyl (50µg/ml)** 1,5-3µg/kg i.v.

### Speciellt att tänka på

- Om andningsdepression eller hypotension uppträder ventiler patienten och ge eventuellt **Naloxonhydroklorid**. Under långa transporter kan upprepade doser behövas om andningsdepression uppträder.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**