

Betametason injektion Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Betametason, injektionsvätska (4mg/ml)

Indikationer

- Astma/KOL
- Allergisk reaktion/Anafylaxi
- Epiglottit (vuxen)
- Pseudokrupp
- Transfusionsreaktion (behandlas som anafylaxi)

Försiktighet

Kontraindikationer

Biverkningar

Doser

Vuxen

- Anafylaxi, epiglottit, status astmaticsus – Ge inj. Betametason (4 mg/ml) 2 ml. i.v.
- Astma/KOL - Ge inj. Betametason (4 mg/ml) 1 ml. i.v.

Barn

- Allergisk reaktion – läkarkontakt för råd om handläggning
- Astma/obstruktiva besvär, pseudokrupp – Ge inj. Betametason (4 mg/ml) i.v.
 - upp till 1 år: 1 ml i.v.
 - 1-5 år: 2 ml i.v.
 - 6-12 år: 4ml i.v.

Speciellt att tänka på

- Steroider har relativt långsamt insättande effekt.
- Administreras långsamt, 2 ml på ca 1 min.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare