

Atropin Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Atropin, injektionsvätska (0,5 mg/ml)

Indikationer

- Bradykardi (hjärtfrekvens lägre än 50/minut)
- Hämning av slemsekretion i samband med Ketanestanestesi
- Stensmärta

Försiktighet

- Enbart symtomatiska arytmier bör behandlas prehospitalt
- Hjärtsjukdom med takykardi
- Hög feber hos barn (atropin hämmar svettning)

Kontraindikationer

Biverkningar

- Ökad hjärtfrekvens
- Excitation, desorientering och hallucinationer (vid höga doser)
- Ackommodations pares
- Muntorrhet
- Miktionsbesvär

Doser

- Symtomgivande bradykardi:
inj. Atropin (0,5 mg/ml) 1 ml i.v. Kan upprepas efter 5 minuter
- Premedicinering inför Ketanestanestesi:
inj. Atropin (0,5 mg/ml) 1 ml i.v.
- Stensmärta:
inj. Atropin (0,5 mg/ml) 0,5 ml i.v. som tillägg till morfin. Dosen 0,5 ml i.v. kan upprepas en gång

Tänk på

- Atropin hjälper inte alltid om rytmen är idioventrikulär men är inte heller skadligt.
- Andra och tredje gradens AV-block är vanligtvis inte känsliga för Atropin.
- Patienter behandlade med betablockerare kan svara sämre på behandlingen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare