

Ringeracetat Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Kristalloid hydreringslösning, infusionsvätska

Indikation

- Vätska och elektrolytförluster
- Spolning av brännskada
- Omläggning med fuktiga dukar

Försiktighet

- Patienter med känd hjärtinkompensation
- Nedsatt njurfunktion
- Kliniska tillstånd där ödem och natriumretention föreligger
- Till patienter under 12 år måste dosen anpassas efter kroppsvikt

Kontraindikationer

Biverkningar

Doser

Vuxen

- Bradykardi, – Sätt inf. Ringer-acetat i.v.
- Hyperglykemi - Sätt inf. Ringer-acetat i.v.
- Trauma (brännskada, bukskada, bäckenskada, höftfraktur, thoraxskador) – Sätt inf. Ringer-acetat i.v.
- Hypovolem-, obstruktiv-, distributiv chock - Ge inf. Ringer-acetat bolusdos 500 ml i.v. Upprepas vid behov.
- Kardiogen chock - Ge inf. Ringer-acetat bolusdos 250 ml i.v.
- Hjärtstopp – Sätt inf. Ringer-acetat i.v.

Barn

- Chock – Ge inf. Ringer-Acetat bolus 20ml/kg i.v. Upprepa vid behov.
- Hyperglykemi – Ge inf. Ringer-Acetat (bolus 20ml/kg) i.v.
- Brännskada – Påbörja inf. Ringer-Acetat i.v.
- Hjärtstopp – Ge inf. Ringer-Acetat bolus 20ml/kg i.v. Upprepa vid behov.

Speciellt att tänka på

- Styr infusionstakten mot det kliniska svaret (systoliskt blodtryck 80-90mmHg).

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare