

Salbutamol Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Salbutamol, inhalationsvätska (2 mg/ml)

Indikationer

- För behandling av astma/bronkobstruktion
- Vid bronkobstruktion vid brännskada/inhalationsskada
- Vid inhalation av skadliga ämnen

Försiktighet

- Kan i mycket sällsynta fall leda till paradoxal bronkospasm. Avbryt behandlingen omedelbart om detta inträffar
- Allergiska reaktioner kan uppträda
- Använd med försiktighet till patienter med svår hjärt-kärlsjukdom och vid takykardi

Kontraindikationer

- Överkänslighet mot Ventoline

Biverkningar

- Takykardi, Palpitationer
- Muskelkramp
- Tremor och huvudvärk

Doser

Vuxen

- Vid alla angivna indikationer:
Ge inh. **Salbutamol (2 mg/ml) 2,5ml**. Kan upprepas vid behov efter 10-20 minuter

Barn

- Vid alla angivna indikationer:
Ge inh. **Salbutamol (2 mg/ml)**, enl tabell. Späd med **NaCl (9 mg/ml)** till 2 ml totalt

Barn	Salbutamol (2 mg/ml) inhalation
Vikt	Volym
5 kg	0,4 ml
10 kg	0,75 ml
15 kg	1,0 ml
20 kg	1,5 ml
25 kg	2,0 ml
≥30 kg	2,5 ml

Kan upprepas efter 15 minuter

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare