

## ReoPro (abciximab)

**Gäller för:** Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

**Faktaägare:** Helen Gustavsson, bitr. avdelningschef, medicinkliniken Växjö  
 Thomas Aronsson, överläkare, medicinkliniken Växjö  
 Carina Nilsson, överläkare, medicinkliniken Ljungby  
 Katarina Svensson, avdelningschef, medicinkliniken Ljungby  
 Therese Nyström, Medicinavdelning 1 HIA medicinkliniken Växjö

Behandling med ReoPro ges i samråd med interventionscenter. Preparatet kan ges i samband med PCI eller till patienter med instabil angina som inte svarat på konventionell terapi och där PCI planeras. ReoPro är ett trombocyttaggregationshämmande medel.

Reopro ges som viktjusterad bolusdos och infusion enligt doseringsschema eller FASS.

**Förpackning:** ReoPro 2mg/ml, injektionsflaska 5ml=10 mg. Om patienten väger 51-90 kg går det åt 3 ampuller till en behandling med bolusdos och infusion. Kontrollera lösningen visuellt, får ej omskakas. Förvaras i kylskåp.

### Dosering

**Bolusdos:** Dra i en injektionsspruta upp önskad volym till bolus och infusion genom speciellt filter. Reopro bör om möjligt ges i separat intravenös infart. Bolusdos ges under 1 minut.

Rekommenderad bolusdos enligt doseringsschema (0,25 mg per kg kroppsvikt)

**Kontinuerlig infusion:** Enligt doseringsschema (0,125 mikrog/kg/min).

**Blandning:** Natriumklorid 9 mg/ml eller Glucos 50 mg/ml 250 ml blandas med 4 ml ReoPro= 8 mg. Det räcker att läkemedlet filtrerats vid uppdragningen.

| Doseringsschema |              |                    |
|-----------------|--------------|--------------------|
| Kroppsvikt (kg) | Bolusdos     | Infusionshastighet |
| 45-50           | 12 mg=6 ml   | 11 ml/tim          |
| 51-53           | 13 mg=6,5 ml | 12 ml/tim          |
| 53-58           | 14 mg=7 ml   | 13 ml/tim          |
| 59-61           | 15 mg=7,5 ml | 14 ml/tim          |
| 62-66           | 16 mg=8 ml   | 15 ml/tim          |

|         |               |           |
|---------|---------------|-----------|
|         |               |           |
| 67-69   | 17 mg=8,5 ml  | 16 ml/tim |
| 70-74   | 18 mg=9 ml    | 17 ml/tim |
| 75-77   | 19 mg=9,5 ml  | 18 ml/tim |
| 78-82   | 20 mg=10 ml   | 19 ml/tim |
| 83-85   | 21 mg=10,5 ml | 19 ml/tim |
| 86-90   | 22 mg=11 ml   | 19 ml/tim |
| 91-93   | 23 mg=11,5 ml | 19 ml/tim |
| 94-98   | 24 mg=12 ml   | 19 ml/tim |
| 99-102  | 25 mg=12,5 ml | 19 ml/tim |
| 103-106 | 26 mg=13 ml   | 19 ml/tim |
| 107-109 | 27 mg=13,5 ml | 19 ml/tim |
| 110-114 | 28 mg=14 ml   | 19 ml/tim |

Fler vikter finns på doskort för ReoPro

### Provtagning

Före infusion: trombocyter, PK, APTT. Trombocyter tas också 2-4 timmar samt 24 timmar efter startad infusion

### Biverkningar, vanliga

Feber, smärta i rygg och bröst, huvudvärk, blödningar, trombocytopeni, hematom, bradycardi, hypotension, illamående, kräkningar

### Biverkningar sällsynta

Hjärtsäckstamponad, andnödssyndrom.

Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma. Adrenalin, dopamin, teofyllin, antihistaminer och kortikosteroider bör finnas i beredskap.

### Handläggning av sjunkande trombocytter

Om TPK sjunker under  $60 \times 10^9/l$  skall tillförsel av ASA och ev. Heparin avbrytas.

Om TPK sjunker under  $50 \times 10^9/l$ , skall trombocyttransfusion övervägas. Om egentlig trombocytopeni föreligger, skall Reoprotillförseln avbrytas

Giltig fr.o.m: 2017-07-07

Giltig t.o.m: 2017-02-16

Identifierare: 44662

ReoPro (abciximab)



### **Vid problem/frågor**

Läkemedelsföretaget Lilly, 08-7378800.

Vid akuta medicinska frågor ring: Customer's Service Center, Geneve 0200-110249. Språk: engelska. Dygnet runtinformation.

Läkemedelsrepresentant för vårt område är Gisela Hardebro, 0730-371 957.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**