

## Smittsamhet - tillstånd med behov av enkelrum

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Faktaägare:** Smittskydds-enheten och Vårdhygien

Behovet och omfattningen av vård på eget rum/isolering ska dokumenteras och regelbundet omprövas under vårdtiden.

Behov av intensivvård eller annan specialistvård ska alltid tillgodoses.

Rum med luftsluss finns på CLV: infektionsklinken, neonatalavdelningen, akutmott, IVA och HIA.

Vid tveksamhet kontakta  
vårdhygien/smittskydd/infektionskonsult/infektionsjour.

**Följande diagnoser ska vårdas på eget rum med egen toalett och dusch.**

**(Saknas dusch sköts personlig hygien på vådrummet/toaletten.**

**I undantagsfall kan gemensam dusch användas som efter användning rengörs och desinfekteras).**

Diagnos	Kommentar
<b>Bältros</b>	<p>Generaliserad bältros - rum med luftsluss</p> <p>Lokaliserad bältros utan nedsatt immunförsvar - samvårdas med patient som haft vattkoppor om denne inte har nedsatt immunförsvar</p> <p>- patient med lokaliserad bältros som täcks av bandage och/eller kläder kan vistas utanför vådrum</p> <p>- patient med lokaliserad bältros till ansikte, uringning och händer stannar på sitt vådrum</p> <p>Lokaliserad bältros och nedsatt immunförsvar - rum med luftsluss</p>
<b>Erysipelas med sår</b>	Under de första 2-3 dagarna med antibiotikabehandling
<b>Gastroenteriter</b>	Calicivirus (misstänkt eller verifierad)

	<p>Clostridium difficile</p> <p>Annan infektiös diarrésjukdom</p> <p>Diarré av okänd anledning tills orsaken klarlagts</p>
<b>Hepatit A</b> <b>Hepatit E</b>	
<b>Infektion med utslag tills orsaken klarlagts</b>	Överväg rum med luftsluss
<b>Influensa, influensaliknande sjukdom</b>	<p>Undantag:</p> <p>Vid platsbrist samvård med annan patient med influensa orsakad av samma influensavirus (A, B respektive H1N1) i samråd med infektionsjour</p> <p>Patient som samvårdats med annan patient innan diagnos verifierats</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konsultera infektionskonsult/ infektionsjour för bedömning</li> </ul> <p>Vid misstanke om okänt agens</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- överväg rum med luftsluss</li> </ul>
<b>Meningit serös enterovirusorsakad</b>	
<b>Meningokocksjukdom</b>	Under 1 dygn efter insatt adekvat antibiotikabehandling
<b>Multiresistent bakterie (misstänkt eller verifierad)</b>	<p>MRSA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rum med luftsluss vid kolonisering/infektion med rikligt vävnadssönderfall</li> </ul> <p>VRE</p> <p>ESBLCARBA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- överväg vård på infektionskliniken</li> </ul> <p>ESBL då riskfaktorer förekommer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diarré/avföringsinkontinens</li> <li>- svår urininkontinens</li> <li>- KAD/RIK</li> <li>- vätskande sår</li> <li>- dränage</li> <li>- rum med luftsluss vid kolonisering/infektion med rikligt</li> </ul>

	vävnadssönderfall  Annan som av smittskydd/vårdhygien bedöms utgöra risk för etablering i vårdmiljö
<b>Mykoplasmapneumoni Annan atypisk pneumoni</b>	Verifierad eller stark misstanke på atypisk pneumoni
<b>Mässling</b>	Rum med luftsluss
<b>Påssjuka</b>	
<b>Röda hund</b>	
<b>Skabb</b>	
<b>Sårinfektion med riklig sekretion</b>	
<b>Tuberkulos</b>	Lung – eller larynxtuberkulos - rum med luftsluss  Efter två veckors adekvat behandling bedöms man smittfri  Patient med tuberkulos i andra organ än lungor eller svalg kan samvårdas med annan patient.
<b>Utbredda hudskador</b>	Omfattande brännskada (> 15% av hudytan) Fjällande hudsjukdom (infekterad hud, aktivt skov)
<b>Vattkoppor</b>	Rum med luftsluss
<b>Övriga infektioner som infektionsläkare/smittskydd/vårdhygien bedömer som smittsamma</b>	

### Nationella Vårdhandboken [Smitta och smittspridning](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig meddela faktaägare.