

Sårbehandling med bakteriebindande medel/antiseptika

Faktaägare: Britt-Louise Andersson, Sårsamordnare, Katarina Madehall, Vårdhygien

Bakgrund:

Antibiotikaresistens är ett allt större problem i vården och äldre personer är mer känsliga för biverkningar av antibiotika, så som allvarliga diarréer. Enligt STRAMA används antibiotika mest mot urinvägsinfektioner och hud och mjukdelinfektioner hos äldre. Dessa medel/ förband används förebyggande för att minska risken för infektion.

Indikation för antiseptika är kritisk kolonisation i sår eller som komplement till antibiotika vid nedsatt cirkulation. Innan behandling med antiseptika påbörjas ska den som behandlar ha kännedom om hur olika antiseptika fungerar och vilket preparat som lämpar sig bäst för behandlingen. Andra läkningshämmande faktorer ska utredas. Antiseptika används som en kur och utvärderas efter 2-4 veckor.

Produkt	Verksam substans	Rengör /rensar	Bakteriebindande	Antiseptisk/ bakteriedödande	Motverkar biofilm	Övrigt
Polymem	Surfactant-F68	X				
Prontosan	Polyhexanid + Biatain	X		X	X	Omslag 15 min eller gel
Sorbact	Acetatväv hydrofob effekt		X			Förebyggande vid operation/ behandling
Aquacel	Cellulosa		X			Kraftigt uppsugande
Activon	Medicinsk honung			X	X	
Iodosorb	Jod			X		Kraftigt uppsugande
Aquacel Ag + Extra	Silver			X	X	Kraftigt uppsugande