

Sårbehandling med antibakteriella förband

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Katarina Madehall och Susanna Lundvall, Vårdhygien
Britt-Louise Andersson, Sårsmordnare
Medicinska kommittéens grupp, Infektion

Vid användning av silverförband rekommenderas i SBU rapport Nr 2010-02 att en systematisk uppföljning och sammanställning av effekten bör göras. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt när det gäller effekten av silverförband. I första hand används behandlingshonung, jod eller Prontosan när bakteriedödande förband är indicerat. I andra hand silverförband. Indikationen är kritisk kolonisation.

Innan behandling med silverförband påbörjas ska utsedd sjuksköterska/sårombud, som fått utbildning i antibakteriella förband, konsulteras för diskussion och planering av behandlingen. Andra läkningshämmande faktorer ska först utredas. Användningstiden begränsas till 2-4 veckor.

Efter avslutad behandling fylls formuläret för ”Utvärdering av silverförband” i och skickas till Vårdhygien.

Formuläret finns på Region Kronobergs interna hemsida, [blankettarkivet \(mapp vårddokumentation\)](#) samt i Vårdhygieniska rutiner för kommunal vård.

Produkttyper	
Honung, tub eller kompress	Medicinsk honung till måttligt vätskande sår
Jod, tub eller kompress	Cadexomerjod till rikligt vätskande sår
Prontosan, vätska eller gel	Polyhexanid och undecylenamidopropylbetain till sårsköljning eller omslag
Silver, kompress	Silver, efter diskussion med sårombud

Nationella Vårdhandboken [Sårbehandling](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig meddela faktaägare.

Utvärdering av silverförband

Patient

Födelseår	Kön Man <input type="checkbox"/> Kvinna <input type="checkbox"/>
-----------	---

Sår diagnos/sårtyp

Venöst bensår <input type="checkbox"/>	Arteriella sår <input type="checkbox"/>	Blandinsufficiens <input type="checkbox"/>	Trycksår <input type="checkbox"/>
Diabetesfotsår <input type="checkbox"/>	Postop sår/ efter behandl <input type="checkbox"/>	Traumatiska sår <input type="checkbox"/>	Annat <input type="checkbox"/>

Förband före silverbehandling

Sorbact <input type="checkbox"/>	Aquacel <input type="checkbox"/>	Honung <input type="checkbox"/>	Iodosorb <input type="checkbox"/>
Protosan <input type="checkbox"/>	Ättiksyra <input type="checkbox"/>	Polyuretanskum eller annat <input type="checkbox"/>	

Hur länge har såret funnits?

Mindre än 1 månad <input type="checkbox"/>	1-6 månader <input type="checkbox"/>	Mer än 6 månader <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------	---

Har antibiotika använts parallellt med silverförband?

Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
-----------------------------	------------------------------

Behandlingstid för silverförband

1 vecka <input type="checkbox"/>	2 veckor <input type="checkbox"/>	3 veckor <input type="checkbox"/>	4 veckor <input type="checkbox"/>	5 veckor eller mer <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---

Resultat

Läkt <input type="checkbox"/>	Minskat <input type="checkbox"/>
Minskade tecken på kolonisation dvs mindre smärta, dålig lukt, vätsking <input type="checkbox"/>	Ingen förbättring <input type="checkbox"/>

Utvärderingen gjord av

Namn	Datum
Arbetsplats	Telefon

Utvärdering skickas till Katarina Madehall, Vårdhygien, Centrallasarettet, 351 85 Växjö

Britt-Louise Andersson, sårsmordnare
hygiensjuksköterska

britt-louise.andersson@kronoberg.se

Katarina Madehall,

katarina.madehall@kronoberg.se