

## Bisfosfonatinfusion och provtagning hos patienter med myelom

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

Tandläkarbedömning innan infusionsstart.

### Bisfosfonatinfusion

Ges som intravenös infusion. Finns i flera preparatnamn och styrkor. Oftast ges läkemedlet med 4 veckors intervall men ibland glesare av praktiska skäl. Vid stabil sjukdom övervägs utsättning efter 2 års behandling. Vid progress återupptas behandlingen med längre dosintervall.

### Provtagning för patienter utan aktiv myelombehandling

Speciell provtagningsmapp finns i Cosmic, beställning provbunden under **Hema, Myelom, Med.** Prover som tas vid varje infusionstillfälle är Hb, LPK, TPK, Neutrofila, P/S-Calciumjon (pH7,4), S-kreatinin, S-CRP, glucos och albumin.

Var tredje månad tas även S-M komponent och U-M komponent, stickprov, längd och vikt.

### Återbesök

Patienten planeras in för återbesök med patientansvarig läkare minst var 6:e månad tillfället efter M-komponenten är tagen, gärna i samband med besök på dagvården. Läkarsamtal i övrigt vid behov.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.