

Solu-Medrol till MS-patienter, Med CLV.

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

Indikation:

MS skov som kräver intensiv behandling av kortison.

Dosering:

Vanligtvis ges 1 g Solu-Medrol och detta upprepas i tre dagar, följ läkarordination.

Hantering:

Blanda vätskan i ampullen med Solu-Medrol pulvret (1g) så att det blir en klar vätska. Blanda därefter den koncentrerade lösningen med 100 ml NaCl. Sammanlagt blir det ca 115 ml infusion som ska ges intravenöst under 30 minuter (har patienten tidigare känt obehag vid infusionen så kan den ges under längre tid).

Att tänka på:

I samband med Solu-Medrol behandling bör man kontrollera hur patienten mår. Blodsocker behöver inte följas.

Det är vanligt att patienten blir mycket piggt efter att ha fått Solu-Medrol och att det leder till sömnbesvär. Andra biverkningar är att patienten törstar, känner hunger samt får en slags metallsmak i munnen. I vissa fall kan det behövas läkemedel som skyddar magen.

Pågående behandling av bromsmediciner ska **INTE** avbrytas i samband med Solu-Medrolkuren.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.