

CSC - central serös chorioretinopati

Gäller för: Ögonkliniken

Symtom (klassisk serosa)

- Synnedsättning - ofta hyperopi
- Mikropsi
- Metamorfopsier
- Fläck centralt/centralskotom
- 25 - 50 år

Diagnos

- Anamnes
- FA/ICG
- OCT - serös avlossning av neuroretina med defekter och läckage i PE, inklusive PED. Vid akut CSC fokal skada i PE, vid kronisk CSC multifokal/diffus skada i PE.
- Autofluorescens, descending tracks

Prognos

God självläkning

Visus lika med eller mer än 0,4 i 94%.

Visus mindre än 0,6 i 5%.

Recidiv i 20-30 %

Risk för CNV.

Kronisk CSC.

Behandling

Akut CSC: Expektans 3 - 4 (6) månader. FA/ICG kan övervägas om symptomen kvarstår efter 3 - 4 månader samt inför laserbehandling, fotokoagulation av läckande punkter.

Kronisk CSC: PDT. (standarddos, 42 sek halva tiden, spot + 500 my)
Behandling ges under ledning av FA (läckaget). Rebehandling efter 3 månader vid behov.

Kontroll

Var 4:e till 6:e vecka.

Genes

- multifaktoriell
- stress
- graviditet
- steroider
- genetiska faktorer, hypertension.

Differentiell diagnos

Kronisk CSC kan vara svår att skilja från CNV vid akut CSC.
PCV, ockult membran, klassiskt membran.

Giltig fr.o.m: 2015-10-08
Giltig t.o.m: 2017-10-08
Identifierare: 49854
CSC - central serös chorioretinopati



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.