

Glasögonföreskrivning barn

Gäller för: Ögonkliniken

Glasögon övervägs till barn med

- Synnedsättning
- Astenopa besvär
- Fusionssvikt
- "Dyslexi"

Skia/refraktometri i cykloplegi mäts efter 40 min. (Ej över 60 min eftersom den cykloplegiska effekten avtar).

<4 år

Glasögon vid refraktionsfel som ger synskärpa under den för åldern förväntade.

Hyperopi - >4 dioptrier eller anisometri. Avdrag på 2 dioptrier. Vid inåtskelning ges full korrektion.

Astigmatism - \geq -1,5 dioptrier eller anisometri.

Myopi - > -2 dioptrier eller anisometri.

4 år

Synskärpa 0,65 o a, omkontroll om refraktionen < +3 dioptrier. Annars glasföreskrivning.

Synskärpa 0,8 o a och refraktion \geq +3, omkontroll vid 5 års ålder med KM-test.

5-8 år

5 år - godkänd synskärpa 0,7 o a (KM).

6 år - godkänd synskärpa 0,8 o a (KM).

7 år - godkänd synskärpa 0,9 o a (KM/bokstavstavla).

Vid ovanstående synskärpa och refraktionsfel $\geq +3$ refraktionering hos ortoptist. Vid sämre synskärpa eller sidoskillnad - glasförskrivning. Hyperopi avdrag på 2 dioptrier. Myopi och astigmatism fullkorrigerig.

Vid astenopa besvär kan glas behöva ges även på svagare hyperopi.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.