

Glaukom - pigment dispersion syndrom

Gäller för: Ögonkliniken

Orsak:

Pigment lossnar från iris och ger tilltäppning i kammarvinkeln vilket kan leda till ökat ögontryck med glaukom som följd.

Riskfaktorer:

Ses oftast hos yngre män, närsynthet vanligt, tillfällig tryckstegring kan uppstå vid pupilldilatation och vid fysisk träning.

Fynd:

Pigmentskador på iris, eventuellt pigment på endotelet, Krukenbergs spole, pigment i kammarvinkeln.

Symtom:

Patienten har inga symtom, upptäcks oftast tillfälligt eller vid manifest glaukom.

Uppföljning och behandling:

Vid normalt ögontryck (hos denna patientgrupp $IOP < 21$) : tryckmätning hos sköterska alternativt optiker 1 gång per år. Utveckling av glaukom kan ske efter mer än 10 år.

Vid $IOP = 21$ eller högre överväg behandling alternativt tätare tryckkontroller. Denna patientgrupp ska behandlas tidigt.

"Vanlig" droppbehandling.

SLT kan användas som komplement (OBS låg energi, kan ge trycktoppar).

Glaukomkirurgi används med vanlig indikation.

Giltig fr.o.m: 2016-02-01
Giltig t.o.m: 2018-02-01
Identifierare: 49917
Glaukom - pigment dispersion syndrom



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.