

## Hemangiom - Propranololbehandling

Gäller för: Ögonkliniken

Vid synhotande ögonlockshemangiom: Ortoptistbedömning - sidoskillnad i visus?

Starta ocklusionsbehandling.

Remiss till barnkliniken för start av behandling med betablockare/propranolol.

### Peroral Propranololbehandling:

T Inderal 10 mg, alternativt Lösning Propranolol 1 mg/ml,  
i dosen 2 mg/kg/dag.

Ex: Barnets vikt 5 kg ger dosen 10 mg/dag = 5 mg x 2 = T Inderal 10 mg, ½ x 2,  
eller lösning Propranolol 5 ml x 2.

Ökning med 1 ml = 1 mg för varje kg ökning i kroppsvikt.

Behandlingen pågår så länge hemangiomet tillväxer, d v s ca 1 ½ år.

Lokalbehandling med lösning Timolol ögondroppar 0,5 %, som påstrykes 2 ggr  
dagl. har beskrivits ha snabb och god effekt utan biverkningar och behov av  
speciell kontroll eller övervakning.

Täta kontroller hos ortoptist (visus, skelning).

Kliniska kontroller, foto.

Giltig fr.o.m: 2016-10-17  
Giltig t.o.m: 2021-04-11  
Identifierare: 49930  
Hemangiom - Propranololbehandling



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.