

## Lut, syra etc. ögon

Gäller för: Ögonkliniken

### Lut, syra, osläckt kalk, oljor, växtsaft, okänd vätska eller misstanke om ovanstående

- När patienten ringer – be denne omedelbart spola ögat.
- Vid lång resväg – spola under resan.
- Lägg patienten på rygg.
- Om osläckt kalk – se till att alla partiklar plockats ut.
- Spärra upp ögonlocken och spola.
- Använd Natriumklorid spolvätska, ex vis 100 ml först.
- Koppla ett spoldropp med infusion Natriumklorid om 1000 ml.
- Be patienten titta åt olika håll och låt det rinna flödigt.
- Vänd övre ögonlocket med hjälp av öronpinne och spola detta.
- Fortsätt spolningen till minst 500 ml vätska använts. I regel skall dock 1000 ml ges.
- Upprepa proceduren att vända övre ögonlocket och spola vid upprepade tillfällen.
- Gör ovanstående även om patienten uppger sig ha gjort det redan innan (eller annan har gjort det).

- Man kan inte spola för mycket – bara för lite.
- Ge ej förband och helst inte salva.
- Kontakta jourhavande efter spolning vid misstanke på nedanstående.

**Extra farligt är starka baser som lut eller osläckt kalk, men även starka syror som myrsyra.**

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**