

## Ozurdex - retinal ventrombos

**Gäller för:** Ögonkliniken

### **Indikation:**

Se PM "retinala ventromboser - behandling".

Alternativ till Ozurdex är Lucentis.

Ozurdex olämpligt vid avancerat glaukom och okontrollerad okulär hypertension.

### **Åtgärd:**

- Tillsvidare för vi det så här: följ PM för trombos.
- Ozurdexbehandling övervägs: Lägg patientens journal, gärna med en kort sammanfattning, i facket för "diskussionsfall intravitreal injektion" i arkivet, för bedömning av maculagruppen.
- Efter beslut om behandling dikterar patients PAL (eller läkare i maculagruppen) "patienten sätts upp för Ozurdexinjektion" i journalen, samt skickar E-recept på Fucithalamic; DS 1 x 2 i 5 dagar före injektionen.
- Sekreterare i retinateamet skickar kallelse till patienten och tid för första återbesöket. I kallelsen påminns patienten om att hämta ut sitt recept.

### **Kalleiser:**

Patienten kallas på samma sätt som till Lucentisinjektion. I samband med kallelsen påminns patienten om att hämta ut E-recept på Fucithalamic att ta i aktuellt öga fem dagar preoperativt x 2.

### **Operationsdagen:**

Samma som för Lucentis med visus (ETDRS, Lix, dilaterande droppar, Tetracaindroppar).

**På operationsavdelningen:**

Hantering som vid annan IVT.

**Återbesök:**

- Åb 1: usk 2-3 veckor efter injektionen. (Tid bifogas kallelsen till operation).
- Åb 2: Läkare 2 månader efter injektionen med OCT.
- Åb 3: Läkare 4 månader efter injektionen med OCT, behov av reinjektion?

Giltig fr.o.m: 2015-10-20  
Giltig t.o.m: 2017-10-20  
Identifierare: 50046  
Ozurdex - retinal ventrombos



**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**