

Tapetoretinala degenerationer

Gäller för: Ögonkliniken

Vid misstanke om tapetoretinal degeneration ska följande undersökningar utföras:

- Avståndssynskärpa
- Närsynskärpa
- Färgsinne
- Allmänt ögonstatus
- Synfält enligt Goldmann
- Adaptometri
- Ögonbottenfotografering (färg)

Vid oklarhet eller stärkt misstanke, remiss till Lund.

Behandling:

Efter ställd diagnos skrives remiss till syncentralen.

Patienten erbjuds också behandling med Carlsson A-Vitamin 15 000 IE dagligen om inga kontraindikationer föreligger. Licenspreparat.

Innan behandling inleds och en gång årligen kontrolleras leverstatus.

Kliniska kontroller sker varje/vartannat år beroende på ålder, status med mera.

Undersökningen som då ska utföras:

- Avståndssynskärpa
- Närsynskärpa
- Färgsinne
- Synfält enligt Goldmann
- Ögonbottenfotografering (SLO)

Länkar:

SOTA-ärflika näthinnesjukdomar (www.swedeye.org/wp-content/uploads/SotA_RP.pdf)

Svenska RP-föreningens hemsida (www.srpf.a.se)

Giltig fr.o.m: 2015-01-14
Giltig t.o.m: 2017-01-14
Identifierare: 50080
Tapetoretinala degenerationer



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.