

Tbc-behandling, Ethambutol - ögonkontroller

Gäller för: Ögonkliniken

Kontroller vid behandling med ethambutolinnehållande preparat rekommenderas pga risken för opticusneuropati, typ opticusneurit.

Ethambutol ingår i MYAMBUTOL (och RIMSTAR)

Före behandlingens början samt ca 1 gång varje - varannan månad under fortsatt behandling, rekommenderas kontroller av visus, jaeger och färgsinne (BK och eventuellt SST).

(Obs! Kontrollera vid besöket att patienten fortfarande står på Myambutol!)

Vid normala resultat skickar sköterskan resultatet till dr Cristin Holm + behandlande läkare, infektionskliniken, samt ger patienten ny tid för kontroll om 2 månader. Vid eventuellt förlängd behandlingstid mer än 6 månader kan vid normala resultat kontrollerna glesas ut ytterligare till varannan månad, lämpligen ges sista tiden efter behandlingens slut.

Vid nedsatt visus och/eller defekt färgsinne tas kontakt med ansvarig ögonläkare som meddelar infektionskliniken. Synfältsundersökning (synfält Humphrey 30-2) samt läkarbedömning görs så snart som möjligt.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.