

## - rutin för utredning och behandling **icke palpabel testis hos pojkar**

**Gäller för:** Kirurgkliniken

Vid icke palpabel testis upptäckt på BB eller annorstädes under det första levnadsåret skall pojken sättas upp för undersökning på kirurgmottagningen vid ca 6 mån- 1 års ålder.

Kan man vid den undersökningen palpera en retinerad testikel sätts barnet upp för operation på den aktuella sidan. Barnet bör opereras strax efter 1 års ålder. Ingreppet görs som dagkirurgi och barnet vårdas postoperativt på barnavdelningens dagvårdsavdelning.

Kan man inte palpera någon testikel på någondera sidan görs ultraljud av ljumskar och skrotum.

Hittar man på ultraljudet en eller två testiklar extraabdominellt sätts barnet upp för operation här.

Operatören bestämmer vilka barn som skall följs upp efter 6 månader på kirurgmottagningen.

Hittar man inte någon testikel på ultraljud på någon av sidorna alt bilateralt remitteras barnet till Universitetssjukhuset i Lund, Barnsjukvården där man som regel sätter upp barnet utan föregående besök för palpation i narkos. Kan man inte känna något går man vidare med laparoskopi och ev operation i samma seans. Uppföljningen av barn opererade i Lund sker här i Växjö.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**