

Regler vid extravasal injektion av radiofarmaka

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Bild- och funktionsmedicin, Medicinsk fysik

På klinik

Försök slutföra den undersökning som planerats om det är möjligt t.ex genom att förlänga undersökningstid.

Då extravasal injektion inträffat tas bilder över injektionsstället samt de kroppsdelar där aktiviteten i övrigt ansamlats (vanligen målorganet för den avsedda undersökningen samt blåsan). Om möjligt tas även en bild över injektionsstället någon eller några timmar senare. Kontakta sjukhusfysiker.

Om aktiviteten ligger samlad i ett mycket litet område (enstaka mm) vid injektionsstället kan du försöka sprida volymen genom injektion av koksalt eller lätt massage över injektionsstället.

Skriv avvikelserapport i Synergi.

Sjukhusfysiker

Absorberad dos i injektionsstället beräknas med hjälp av uppgifter om volym från bildmaterial och uppgift om beräknad injicerad aktivitet. För beräkning används Platinadokument 14420 ”Dosberäkning extravasal injektion”

Rapportering sker i Synergi.

Cheffysiker bedömer om anmälan till SSM är aktuell.

Giltig fr.o.m: 2017-01-11

Giltig t.o.m: 2018-12-30

Identifierare: 6818

Regler vid extravasal injektion av radiofarmaka



REGION
KRONOBERG

1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring