

Sepsis, barn Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Orsak

Infektion med systempåverkan

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S Allmänpåverkan. Feber/frossa/undertemp. Svängande feber. Dyspne. Takykardi. Utslag. Huvudvärk. Diarré. Kräkningar. Buksmärta. Smärtor armar/ben. Dricker/ammar/äter.

O Infektionsinsjuknande – långsamt, snabbt eller urakut

P

Q

R

S

T

A Antibiotika

M Antibiotika. Immunomodulerande behandling ex. kortison, cytostatika, reumaläkemedel.

P Diabetes. Cancer. Tidigare infektioner. Nyligen opererad. Sår/bett. KAD/annan infart. Sjukhusvistelse. Missbruk. Splenektomerad. Mb Down. Immunbristssjukdom.

L

E Utomlandsvistelse. Annan lindrig infektion (ÖLI, UVI). Infektioner hos närstående.

Undersökning

Riktad	AF/HF/BT åldersspecifikt. Takykardi får ej förklaras med feber! Kvidande, gnyende andning, indragningar och näsvingespel är allvarliga tecken. Nackstelhet (se meningit!) P-glukos vid medvetandepåverkan. Helkroppundersökning: petekier, erysipelas, infektionsfokus (katetrar urin/iv, sår, abscesser). Varm/kall perifert. Kapillär återfyllnad.
---------------	---

Behandling

- Tidig vätskebehandling. Bolusdoser med Ringer-Acetat 20ml/kg. Infusionstakten styrs för att uppnå normalt blodtryck för åldern.
- Rapportera/förvarna misstanke om sepsis.

Övervakning

- EKG

Tänk på

Diarré och kräkningar är vanliga symtom vid sepsis och misstolkas lätt som gastroenterit. Andra differentialdiagnoser är influensa och lungemboli. Hypotension p.g.a. sepsis är ett mycket allvarligt symtom hos barn.

RETTS-verktyget är trubbigt vid sepsis. Notera att flera gula alternativt orange parametrar indikerar högre risk. Har patienten flera gula parametrar under sepsis kan patienten vara "röd" i verkligheten.

Alltid kontakt med barnläkare vid:	
Spädbarn < 3 månader med feber $\geq 38,0$ °C	Reagerar inte på undersökningen
Barn i alla åldrar med feber $> 41,0$ °C (hyperpyrexia)	Vaknar inte eller väcks men somnar igen
Spädbarn (< 1 år) med temperatur $< 36,0$ °C (hypotermi)	Allvarligt sjuk enligt föräldrarna
	Skriker svagt, gällt eller kontinuerligt, gnyr

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare