

Akuta läkemedel och utrustning inom primärvården

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Oskar Lindfors ST-läkare vårdcentralen Rottne
Måns Faxén, ST-Läkare vårdcentralen Centrum
Erik Falk, ST-läkare akutkliniken
Roland Olofsson-Dolk, Medicinsk rådgivare Kundvalsenheten
Kerstin Cesar, sjuksköterska ProACTcourse
Pär Lindgren, chefläkare Region Kronoberg
Olle Bergström, överläkare medicinkliniken
Anna Wimmerstedt, överläkare infektionskliniken

Innehåll

Akuta läkemedel och utrustning inom primärvården	1
1 Akutvagn	2
1.1 Låda 1 – Läkemedel	2
1.2 Hjärtlåda i Låda 1	3
1.3 Låda 2 – Fri venväg + DE	3
1.4 Låda 3 – Fri luftväg	4
1.5 Låda 4 – B+C	4
2 Övrig utrustning vagn	4
3 I vanligt läkemedelsförråd i låda märkt akut-läkemedel	5

1 Akutvagn

Alla vårdcentraler bör ha en akutvagn. Det finns en beskrivning med fotografier på hur utrustningen skall organiseras.

För att undvika risk att nyckeln glöms i ett akut rekommenderas att denna hängs på en krok i näst översta lådan, alternativt att vagnen låses upp varje morgon och att nyckeln sitter i. De läkemedel som finns i vagnen är så liten mängd att risken med att inte komma åt läkemedel i ett akut läge väger tyngre än risken att någon obehörig stjälar läkemedel.

En bläddermapp med indikationer och enkla steg för steg instruktioner för respektive läkemedel tas fram samt enkla steg för steg manualer för omhändertagande och läkemedelsbehandling av de mest akuta tillstånden ska finnas i akutvagnen.

Inom primärvården rekommenderar **EJ** intraosseösa nålar, intubationsutrustning eller larynxmask. Om en enhet trots det väljer att ha något av detta måste personalen ha dokumenterad utbildning och det skall ingå i övningar som görs. Årlig färdighetsträning på KTC för berörd personal är ett måste.

Nödtrakeotomi/koniotomi skall **EJ** utföras på vårdcentral och utrustning för detta skall inte finnas. De enheter som har utrustning för detta skall kassera / återlämna denna.

Syrgasgrimma utgår, istället används öppen mask till alla patienter. Grimma bör inte finnas på vc.

1.1 Låda 1 – Läkemedel

Läkemedel	Antal	Kommentar
Adrenalin 0,1 mg/ml	2 amp á 10 ml	(om A-HLR, utgår annars)
Adrenalinpenna, Emerade 0,15mg	2 st + 2 st i vanligt läkemedelsförråd	0-ca 10 år (30-40 kg) Anafylaxi
Adrenalinpenna Emerade 0,5mg	1 st+1 st i vanligt lm-förråd	>10 år (>30-40 kg) Anafylaxi
Atropin 0,5 mg/ml	2 amp à 1 ml	Bradykardi
Inj Betapred 4 mg/ml	2 amp à 1 ml	Anafylaxi
Cordarone 50 mg/ml	3 amp à 3 ml	(om A-HLR, utgår annars) – ges outspätt till vuxen patient

Inj Glucagon 1 mg	2 förfyllda sprutor	(hypoglukemi)
Inj Glukos 300 mg/ml	2 ampull à 10 ml	(ytterligare amp i vanligt lm-förråd)
Midazolam (Buccolam)	Förfyllda sprutor 5 mg, 7,5 mg och 10 mg	för buccal adm (efter vikt)
Natriumklorid 9 mg/ml	2 amp à 20 ml	för spolning och ev spädning
Naloxon 0,4 mg/ml	2 amp à 1 ml	Antidot opiater ffa vid iatrogen andningsdepression
Fentanyl 50 ug/ml	1 amp à 2 ml	Smärta (Intranasal administrering)
Sprutor, kanyler, etiketter för sprutmärkning etc		

1.2 Hjärtlåda i Låda 1

Läkemedel	Antal	Kommentar
Inj Morfin 10 mg/ml	2 amp à 1 ml	Bröstsmärta
Nitrolingual		Akut koronart syndrom
Inj Seloken 1 mg/ml	2 amp à 5 ml	Akut koronart syndrom + takykardi o/e hypertension
Trombyl 75 mg	4 tabletter	Akut koronart syndrom
Alla läkemedel bör finnas med minst 2 st i akutvagn i händelse av att en går sönder/spills ut. I övrigt bör påfyllning finnas i vanligt läkemedelsförråd men inga extra i akutvagn.		

1.3 Låda 2 – Fri venväg + DE

		Kommentar
Perifer venkateter (PVK)	(0,7 0,9 1,1 och 1,3)	
Tillbehör venkateter ex fästmaterial, anslutningar, ev 3-vägskran		
Ficklampa		
Reflexhammare		
Pulsoximeter		(barn+vuxen)

1.4 Låda 3 – Fri luftväg

		Kommentar
Nasofaryngealtub (näskantarell)	nr 28 och 32 2 av varje	
Gel till näskantarell		
Svalgtuber		(sortimentlåda)
Magills tång		(om det finns laryngoskop – inga nyinköp av laryngoskop magills tång utgår om laryngoskop ej finns)
Tillbehör till ev laryngoskopandtag – blad vuxen och barn, batterier vid sidan av ej i skopet		

1.5 Låda 4 – B+C

		Kommentar
Pocketmask med syrgasnippel		vuxen och barn
Mask och blåsa (engångs)		barn och vuxna (olika maskstorlekar finns i resp förp)
Reservoarmask		vuxen och barn
Öppen mask (oxymask)		vuxen och barn O2 0,1-15 L/min
Blodtrycksmanchett		vuxen+ barn
Stetoskop		

2 Övrig utrustning vagn

Defibrillator med tillbehör		(rakhyvel, vuxenplattor pappershandduk etc) på antiglidplatta på bordet
Handsprit		
Sprittork		
Tejp + kompresser + plåster etc		
Liten stickande/skärande avfall		
Ev liten övrigt avfall		
Droppkrok med Ringeracetat 1 L		
Sugkatetrar Nr 8 och 14		2 st av varje i avsett ställ på sidan

Sug skall finnas på akutrum – om ny måste köpas in rekommenderas upphandlad modell med uppladdningsbart batteri som kan monteras på sidan av vagnen. Skall vara kopplad och klar att använda när sugkateter kopplats på.		
Bläddermapp med LM-info, behandlingspm etc enl ovan.		
Ev handskhållare med engångshandskar stl s, m, l samt engångsförkläden		
Skyddsglasögon		
Munskydd		
Akutjournal+HLR-lathund		
Oxygentub		(på vc skall finnas oxygen för upp till 1 h adm med 15 L/min)
Nalle/Gosedjur		
Penna och anteckningsblock		
Klädsax		

3 I vanligt läkemedelsförråd i låda märkt akut-läkemedel

Läkemedel		Kommentar
Inj Adrenalin 1 mg/ml	1 ml	(för inhalation)
T. Betapred 0,5 mg	10 tabl	(Allergi)
Inh Combivent	2,5 ml	(för inhalation)
Inh Ventoline 5 mg/ml	1 ml	(för inhalation)
Inj Glukos 300 mg/ml	10 ml	(hypoglukemi)
S Spasmofen	2 st	(stensmärta)
Inj Voltaren 25 mg/ml	2 ml	(njursten)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.