

## Sendoxaninfusion, rutin

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

### Förberedelser på reumamottagningen

1. Läkaren ger en första information om behandling i samband med läkarbesök.
2. När en patient remitteras till dagsjukvården skickar sekreteraren ingen formell remiss utan ett messenger till **Medicinska dagsjukvården Växjö, brevlåda**. Sekreteraren skriver i journalen ”messenger skickat till dagvården”.

### Förberedelser på dagvården

1. Sjuksköterska tar telefonkontakt med patienten och bokar tid för första Sendoxanbehandlingen, informerar om hur lång tid behandlingen tar och om provtagning samt skickar kallelse. Gör notering i konsultläkarens tidbok.
2. Patienten ska ta prover 2 dygn före behandling: blodstatus, diff, leverstatus, elstatus, CRP, SR och urinsticka. Vid njurengagemang tas även U-albumin/kreatininkvot.
3. Kontrollera provsvar. Om dessa är avvikande tar sjuksköterska kontakt med patienten för att förhöra sig om allmäntillstånd och eventuella infektionstecken. Därefter kontaktar sjuksköterskan konsultläkaren.

### Förberedelser och administrering av Sendoxaninfusion

1. Mät blodtryck, puls, temp, längd och vikt.
2. Förbered patienten inför infusion med perifer venkateter. Koppla spoldropp NaCl 9 mg/ml, 500 ml.
3. Läkaren träffar patienten på dagvården och ordinerar Sendoxan i cytodos. Infusion Solu-Medrol ordineras i enskilda fall som då ges under 30 minuter, ordineras i cosmic. Ge Ondansetron, enligt ELAS.

4. Strax före infusion Sendoxan ges injektion Uromitexan. Infusion Sendoxan ges under 2 timmar. Ge samtidigt infusion NaCl 9 mg/ml 500ml, denna infusionen pågår i 4 timmar. Injektion Uromitexan ges även 4 timmar efter Sendoxanstart. Tablett Uromitexan skickas med patienten hem att ta 8 timmar efter Sendoxan-start. Dessa läkemedel signeras i ELAS.
5. Informera patienten om att det är viktigt med riklig dryck under behandlingsdygnet.
6. Sendoxanprover tas 1 vecka efter behandlingen: reuma-cytostatikaprover och urinsticka.
7. Notera nästa behandling i konsultläkarens tidbok. Provtagning 2 dagar före nästa behandling: reuma-cytostatikaprover och urinsticka. Vid njurengagemang tas även U-albumin/kreatininkvot.
8. De första 3 infusionerna ges varannan vecka därefter ges behandlingen var tredje vecka. Behandlingen ges i 10 kurer.
9. När hela Sendoxanbehandlingen är avslutad och om patienten planeras för Imurelbehandling, tas TPMT-prov. ANCA C + P prov tas 1 vecka efter avslutad behandling.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.**