

RoActemrainfusion, rutin

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

Förberedelser på reumatologmottagningen

1. Läkaren ger en första information om behandlingen i samband med läkarbesök.
2. Kontroll av längd och vikt.
3. Läkaren ordinerar RoActemrainfusion i Cosmic.
4. När en patient remitteras till dagsjukvården skickar sekreteraren ingen formell remiss utan ett messenger till **Medicinska dagsjukvården Växjö, Brevlåda**. Sekreteraren skriver i journalen ”messenger till dagvården”.

Förberedelser på dagvården inför RoActemrabehandling

1. Sjuksköterska har telefonkontakt med patienten och bokar tid för RoActemrabehandling. Informerar om hur lång tid behandlingen tar och om provtagning samt skickar kallelse. Gör notering i konsultläkarens tidbok.
2. Patienten uppmanas ta prover: Reuma, RoActemra/cytostatika, lipidstatus samt screening för blodsmitta 3 - 7 dagar före behandlingen.
3. Kontrollera provsvar. Om något är avvikande tar sjuksköterska kontakt med patienten för att förhöra sig om allmänstillstånd och eventuella infektionstecken. Därefter kontaktar sjuksköterska konsultläkaren.

Förberedelser och administrering av RoActemrainfusion

1. Läkaren träffar patienten på dagvården vid de tre första infusionstillfällerna.
2. Vid efterföljande infusioner gå igenom checklista ”Frågeformulär till patienten”. OBS! CRP kan vara lågt på dessa patienter trots pågående infektion.
3. Förbered patienten inför infusion med perifer venkateter.
4. Mät blodtryck, puls och temp.
5. RoActemra skall vara rumstempererat.

6. Beredning av RoActemra enligt produktresumé. Vagga försiktigt infusionspåsen för att undvika skumbildning.
7. RoActemrainfusionen skall ges under 1 timme. Därefter kopplas NaCl 9 mg/ml spoldropp för att patienten skall erhålla hela RoActemra-dosen.
8. Kontrollera puls och blodtryck efter avslutad infusion.
9. Boka patienten för nästa behandling, notera i konsultläkarens tidbok (Vid de tre första infusionerna.) och beställ prover, Reuma, RoActemra/cytostatika. Lipidstatus ska tas inför 3:e behandlingen.
10. RoActemra-infusion ges med 4 veckors intervall.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.