

Ilomedininfusion, rutin i samband med

Gäller för: Medicinkliniken Växjö

Förberedelser på reumamottagningen

1. Läkaren ger en första information om behandlingen i samband med läkarbesök.
2. Läkaren ordinerar Ilomedininfusion i Cosmic.
3. När en patient remitteras till dagsjukvården skickar sekreteraren ingen formell remiss utan ett messenger till Medicinska dagsjukvården Växjö, Brevlåda. Sekreteraren skriver i journalen ” messenger till dagvården”.

Förberedelser på dagvården inför Ilomedinbehandling

Sjuksköterska tar kontakt med patienten och bokar tid för Ilomedinbehandling. Informerar om hur lång tid behandlingen tar och om provtagning. Skickar kallelse samt gör notering i konsultläkarens tidbok.

1. Patienten uppmanas ta prover: reuma bas 3 - 7 dagar före behandling.
2. Kontrollera provsvar. Om något är avvikande tar sjuksköterska kontakt med patienten för att förhöra sig om allmäntillstånd och eventuella infektionstecken. Därefter kontaktar sjuksköterska konsultläkaren.

Förberedelser och administrering av Ilomedininfusion

1. Läkaren träffar patienten på dagvården vid första infusionstillfället.
2. Förbered patienten inför infusion med perifer venkateter.
3. Mät blodtryck, puls och temp. Kontroller, start och ändring av infusionshastigheten skrivs på arbetsblad/övervakning vid Ilomedinbehandling.
4. Ilomedin 20 mikrogram/ml: 2,5 ml blandas i 247,5 ml NaCl 9 mg/ml = 0,2 mikrogram/ml.
5. Puls och blodtryck mäts var 30:e minut i samband med ökning av infusionshastigheten. Vanlig startdos är 10 ml/timme till normalviktig

Giltig fr.o.m: 2019-06-25

Giltig t.o.m: 2021-06-03

Identifierare: 74923

Ilomedininfusion, rutin i samband med



patient. Individuell ökning av infusionshastigheten med 5 - 10 ml/timme.
Infusionen ges under max 6 timmar i 3 dagar.

6. Patienten observeras under infusionstiden med tanke på eventuella biverkningar. Vanliga biverkningar är huvudvärk, blodtrycksfall, värmekänsla, ansiktsrodnad och illamående.
7. Boka patienten för nästa behandlingsperiod om 4 veckor och beställ reuma bas-prover. Behandlingsperioden varar under vinterhalvåret enligt läkarordination.
8. Vid infusionstillfället i mars/april kontaktas PAL för fortsatt uppföljning.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.