

Vaminolac spoldropp

Gäller för: Barn- och ungdomskliniken

Preparat	Vaminolac
Indikation	Hypernatremi/-kloridemi. Främst till de minsta barnen för att minska natrium- och kloridintagen. På detta sätt ökas aminosyraintaget (proteinintaget), vilket kan vara gynnsamt ur tillväxtpunkt.
Administrationssätt	Kontinuerlig infusion i navelartärkateter eller i perifer artärnål.
Administrationstid	24 h
Spädes med	Sterilt vatten Heparin 100 IE/ml
Beredning	30 ml Vaminolac Spädes med 20 ml sterilt vatten i en 50 ml spruta. Därefter tillsätts 0,25 ml Heparin 100 IE/ml. Koncentration av Heparin 0,5 IE/ml.
Infusionshastighet	0,3-0,5 ml/tim i.a (12ml/dygn)
Observandum	Ordineras som övriga infusioner på läkemedelslista. Vid infusion av isoton Vaminolac-lösning kan alla prover tas från artärkatetern/-nålen (undantag P-aminosyror). Om PKU-prov dras ur artärkateter är det viktigt att man drar rikligt med slask, och att man på PKU-remissen anger att provet är draget ur kateter med pågående infusion av aminosyralösning.
Hållbarhet	Kylskåp 24 timmar Byts var 12:e timme