

Enoxaparin Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Enoxaparin injektionsvätska (100 mg/ml)

Indikationer

- Behandling av ST-höjningsinfarkt i samband med trombolytisk behandling

Försiktighet

- Vid blödningsbenägenhet
- Vid nedsatt njurfunktion när upprepade doser ges

Kontraindikationer

- Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller något hjälpämne
- Aktiv blödning eller tillstånd med hög risk för okontrollerad blödning (septisk endokardit, svår koagulationsrubbing, akut gastroduodenalt ulcus, hjärnblödning, skador och operationer i centrala nervsystemet, ögat och örat)

Biverkningar

- Ökad blödningsbenägenhet

Doser

< 75 år			> 75 år		
Intravenöst Inj. Enoxaparin 100 mg/ml , 0,3 ml i.v.			-		
Subkutant Inj. Enoxaparin viktjusterad dos 1 mg/kg s.c.			Subkutant Inj. Enoxaparin viktjusterad 0,75 mg/kg s.c.		
Kroppsvikt (kg)	Enoxaparin (mg)	Enoxaparin 100 mg/ml (ml)	Kroppsvikt (kg)	Enoxaparin (mg)	Enoxaparin 100 mg/ml (ml)
< 60	60	0,6	< 60	40	0,4
>60 - <70	70	0,7	>60 - <70	50	0,5
>70 - <80	80	0,8	>70 - <80	60	0,6
>80 - <90	90	0,9	>80 - <90	70	0,7
>90	100	1,0	>90	80	0,8

Speciellt att tänka på

- Enoxaparin ges endast på ordination av läkare.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare