

Rutin
Process: Hälso- och sjukvård
Område: Förlossning
Giltig fr.o.m: 2015-11-01
Giltig t.o.m: 2017-11-01
Faktaägare: Maud Carlfalk, Överläkare förlossningen
Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef
Revisions nr: 2
Identifierare: 82128



Kortisonbehandling i lungmognande syfte

Gäller för: Förlossningsavdelningen

Kortisonbehandling i lungmognande syfte rekommenderas i situationer vid hotande prematur förlossning vecka 25+0 - 34+0 där förlossningen inte är omedelbart förestående. Om före vecka 25+0 diskutera med neonatolog.

Injektion Betapred 4 mg/ml ges antingen 24 mg intramuskulärt som engångsdos eller 12 mg intramuskulärt x 2 med 12 timmars intervall.

Steroiddosen upprepas inte i normalfallet. Kan dock förekomma om givits mycket tidigt, men först efter individuellt övervägande.

Kontraindikation

För fostrets del:

Chorioamnionit eller annat tillstånd som kräver omedelbar förlossning.

För mamman:

Tillstånd där kortisonbehandling är uppenbart negativ, t ex ulcus, tuberkulos.

Giltig fr.o.m: 2015-11-01
Giltig t.o.m: 2017-11-01
Identifierare: 82128
Kortisonbehandling i lungmognande syfte



**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare**