

Peniscancer standardiserat vårdförlopp kortversion

Gäller för: Region Kronoberg

Vid misstanke utan annan uppenbar orsak ska patienten remitteras till urolog (filterfunktion).

Remiss skickas till kirurgklinikens remissenhet. Välj remissmall cancerutredning.

Följande *kvarstående* symtom från penis ska föranleda *misstanke*:

- ett svårläkt sår
- röda områden
- en förhårdnad
- illaluktande flytningar från en trång förhud
- återkommande blödningar
- smärta

observera ett eller flera av ovanstående symtom i kombination med förstörade lymfkörtlar i ljumskarna ger välgrundad misstanke, se nedan.

Inför remiss till urolog (filterfunktion), informera om:

- att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
- att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Remissen till urolog (filterfunktion) ska innehålla:

- anamnes, ange särskilt
 - symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
 - företagen utredning
 - inguinalt lymfkörtelstatus
 - tidigare sjukdomar och behandlingar
 - läkemedelsöverkänslighet
 - läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 - social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
- fotodokumentation är önskvärd
- kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
- uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

- klinisk misstanke om peniscancer vid bedömning av urolog eller dermatolog
- histopatologiskt fynd talande för invasiv peniscancer
- ett symptom enligt ovan i kombination med förstörade lymfkörtlar i ljumskarna.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Remiss skickas till kirurgklinikens remissenhet.

Välj remissmall cancerutredning.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.