

Tokolys

Faktaägare:

Vid prematurlt värkarbete och där kontraindikationer inte finns (se PM angående Behandling med Tractocile vid hotande förtidsbörd) är förstahandsmedlet Bricanyl i form av injektion eller kortvarig infusion.

1. Som förstahandsbehandling ges lämpligen 0,25 mg Bricanyl subcutant. Om detta stoppar värkarna kan det ibland räcka som behandling eller följas av ytterligare enstaka injektioner. Tablett Diklofenak 50 mg x 3 i tre dagar kan vara ett komplement vid graviditetslängd upp till 30 veckor.
2. Om Bricanyl subcutant inte hejdar värkarna föreslås Bricanyl i intravenös infusion. Bricanyldropp beredes av 2,5 mg Bricanyl i 500 ml 5,5% glukos. Börja med 120 ml/timme. Puls och blodtryck kontrolleras var 10:e minut den första timmen och sedan var 30:e minut. Om värkaktiviteten slår ut med denna behandling bibehålles droppakten i 1 timme och sänks därefter till 60 ml/timme. Denna underhållsdos bibehålles i 8 timmar. Om sedan lugnt sättes Bricanyldroppet ut och ersättes med Bricanylinjektioner 0,25 mg subcutant var 6:timme ett dygn.
3. Om Bricanylinfusion 120 ml/timme inte slår ut värkarbetet, gå istället över till behandling med Tractocile.
Behandling med Tractocile skall övervägas tidigare vid vissa situationer såsom: starka värkar och låg gestationsålder, biverkningar av Bricanyl, maternell diabetes, hjärtsjukdom samt vid duplex.
Se PM angående behandling med Tractocile.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare