

Tractocile vid hotande prematur börd

Faktaägare:

Tractocile – en oxytocinantagonist – är ett läkemedel för behandling av prematurt värkarbete. Det har samma värkhämmande effekt som Bricanyl men betydligt mindre biverkningar för mamman och påverkar inte blodsockerläget hos diabetiker så som Bricanyl. Det är dock ett dyrare läkemedel.

Som initial behandling kvarstår dock Bricanyl som förstabehandling i form av injektioner eller kortvartig infusion om snabb och god effekt nås.

Tractocile bör användas istället för Bricanyl om lång infusionsbehandling krävs, om pat inte klarar Bricanyl på grund av biverkningar, vid maternell diabetes eller hjärtsjukdom, vid kort gravlängd <29 v och vid flerbörd.

Kontraindikationer är desamma som vid all tokolytisk behandling

- intrauterin infektion
- oklar blödning
- misstanke på fetal hypoxi
- andra tillstånd som kräver omedelbar förlossning

Behandling: Intravenös bolusdos följt av kontinuerlig infusion

Infusionslösningen bereds genom att två 5 ml ampuller à 37,5 mg/5 ml tillförs en 100 ml fys NaCl infusionspåse efter att man tömt ut och kastat 10 ml fys NaCl.

1. Bolusdos 0,9 ml (= 6,75 mg) ges av lösningen 6,75 mg/0,9 ml iv under 1 minut.
2. Högdosinfusion 24 ml/tim (= 18 mg/tim) iv av lösningen under 3 tim.
3. Lågdosinfusion 8 ml/tim (= 6 mg/tim) iv av lösningen till lugnt, upp till 45 tim.

Behandling kan upprepas vid behov, då på samma sätt med inledande bolusdos, både upprepad behandling och förlängd sådan efter särskilt övervägande.

Giltig fr.o.m: 2016-01-01
Giltig t.o.m: 2017-11-30
Identifierare: 90097
Tractocile vid hotande prematur börd



**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare**