

## Blödningsrubbnig V av VI

**Faktaägare:**

### Blödnings i perimenopausal period

De sista fem - sex åren innan menopaus innebär en förändrad hormonutsöndring från ovariet och karakteriseras ofta av oregelbundna blödnings.

Olika typer såsom oligomenorré, menorrhagi, kortare blödnings-intervall samt mellanblödnings kan förekomma.

Vanligtvis är det förändrade blödningsmönstret uttryck för ett normalt fysiologiskt åldrande av ovarierna.

I denna åldersgrupp bör man vara frikostig med ultraljudsundersökning samt endometrieprövtagning. Speciellt vid riskfaktorer för corpuscancer (övervikt, diabetes, hypertoni, PCO).

### Vid kontaktblödnings tänk på cervixcancer.

Om anamnesen dock tyder på corpus luteum insufficiens (brunaktiga blödnings en vecka), behandlas denna med Gestapuran eller Provera 10 mg cykeldag 16-25.

Ett kraftigare alternativ är Primolut Nor. Pat uppmantas återkomma, ifall blödningsmönstret ej normaliseras efter tre - fyra månaders behandling.

Eventuell samtidig östrogenbrist kan naturligtvis också behandlas.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**