

Operation med patient i benstöd

Faktaägare:

Operationer med benen i benstöd innebär en försämrad perfusion i benen. Som ovanlig komplikation till detta kan ett kompartmentsyndrom utvecklas med behov av fasciotomi.

Risken för denna komplikation borde vara mindre vid operation med benstöd i form av stövlar men högläget i sig kan också ge denna komplikation.

Åtgärder:

1. Vid uppläggning ska man undvika kraftig böjning i knäleder med risk för både arteriell och venös kompression. Benstöden får inte trycka i fossa poplitea och uppläggningsen skall minimera trycket på vadmuskulaturen.
2. Vid operationer med ben i benstöd/högläge skall narkossköterskan informera operatören när 2 timmar har gått. Beräknar man kunna avsluta operationen på ytterligare en halvtimme kan man fullfölja. Om inte så är fallet bör man ta en paus och lägga ner benen under 10-15 minuter.
3. Om man postoperativt får smärtor i benen skall man ha denna komplikation i åtanke och kontakta ortoped akut.

Giltig fr.o.m: 2016-04-01
Giltig t.o.m: 2018-02-01
Identifierare: 91588
Operation med patient i benstöd



**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare**